

Urmează  
să faci o intervenție  
**LAPAROSCOPICĂ!**



Discută cu medicul despre ADERENȚE

[www.aderente.ro](http://www.aderente.ro)

# ȘTIAI CĂ?

## ADERENȚELE

sunt  
**CELE MAI FRECVENTE**  
complicații după intervențiile  
chirurgicale abdominale  
sau pelvine?<sup>1</sup>



### CE SUNT? ADERENȚELE

Aderențele sunt **benzi de țesut fibros** care leagă organe și țesuturi neconectate între ele în mod normal.

### CÂND APAR?

Există operații la care **riscul formării aderențelor este foarte mare:**<sup>1</sup>

- operația de **fibrom**
- **endometrioza**
- operații **ovariene (chisturi)**
- intervenții la nivelul **trompelor uterine**

### CARE ESTE IMPACTUL?

**Imediat sau la mai mulți ani** de la operație, aderențele pot determina:<sup>1</sup>

- **infertilitate**,
- **dureri cronice** abdomino-pelvine,
- tulburări intestinale (**constipație** sau, în cazuri grave, **ocluzie intestinală**)
- **afectarea calității vieții**

## ADERENȚELE POT FI PREVENITE? **DA!**

Odată ce s-au format, aderențele pot fi înlăturate doar printr-o nouă intervenție chirurgicală, iar riscul de recidivă este foarte mare.<sup>1</sup> Mai mult, prezența aderențelor îngreunează operațiile ulterioare.

**85%**  
risc de refacere  
a aderențelor

De aceea, prevenirea  
formării aderențelor  
este esențială!

### O intervenție eficientă implică:

- tehnicile de bună practică chirurgicală folosite de medicul chirurg
- **utilizarea unei bariere eficiente** pentru prevenirea contactului dintre țesuturile adiacente pe perioada critică de vindecare.



aderență



aplicare HYALOBARRIER®



vindecare fără aderențe

## HYALOBARRIER® GEL ENDO

- este **gel steril de acid hialuronic 100% auto cross-linkat** care se aplică la sfârșitul intervenției chirurgicale pe suprafețele cu risc de formare a aderențelor.<sup>2</sup>
- aderă la țesuturi și **persistă la locul aplicării timp de 7 zile.**<sup>2</sup>
- **previne și reduce formarea aderențelor**, așa cum este demonstrat clinic.<sup>2</sup>

Întreabă medicul despre avantajele **HYALOBARRIER®**

# Pentru că e mai ușor să previi decât să tratezi aderențele post-chirurgicale



## Informații despre produs<sup>2</sup>

Dispozitivele medicale HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO conțin geluri sterile, transparente și cu vâscozitate mare, pe bază de ACP® (polizaharid auto cross-linkat), obținute prin cross-linkarea acidului hialuronic în urma condensării, acidul hialuronic fiind una dintre componentele principale ale țesutului conjunctiv uman, ale epitelului și mezoteliului. Datorită vâscozității lor, HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO aderă perfect la suprafața țesuturilor și a peretelui abdominal, creează o barieră anti-aderențe și separă țesuturile adiacente pe parcursul procesului de reparare secundar intervenției chirurgicale. La șapte zile de la aplicare, gelul se resoarbe complet. Eficacitatea produselor a fost demonstrată în studii clinice în chirurgia abdomino-pelvină.

**Indicații:** HYALOBARRIER® GEL și HYALOBARRIER® GEL ENDO sunt indicate pentru profilaxia sau reducerea formării aderențelor post-chirurgicale din sfera abdomino-pelvină. HYALOBARRIER® GEL este indicat pentru utilizarea în procedurile chirurgicale deschise. HYALOBARRIER® GEL ENDO este indicat pentru utilizarea în procedurile chirurgicale laparoscopice și histeroscopice.

**Contraindicații:** Hipersensibilitate cunoscută la produs.

**Depozitare:** A se menține **refrigerat la temperatura de 2-8°C**. Produsul poate fi depozitat la temperatura camerei o perioadă limitată de timp (nu mai mult de 7 zile), după care trebuie din nou refrigerat. A nu se congela.

**Pentru informații complete, consultați prospectul produsului sau adresați-vă medicului.**

**Producător:** ANIKA THERAPEUTICS S.R.L. Via Ponte della Fabbrica 3/B - 35031, Abano Terme (PD) – ITALIA

**Referințe:** 1. Wallwiener M et al. Gynecol Surg 2012;9:465-466. 2. HYALOBARRIER® GEL și GEL ENDO – Prospectul produselor, 2014.

RO-HLB-PL-L-01-07/15

[www.aderente.ro](http://www.aderente.ro)

**NORDIC**  
PHARMA



DISTRIBUTOR:  
**PHARMA PROMOTION SRL**  
Str. Dimitrie Gusti nr. 8,  
010894, sector 1 București, ROMÂNIA  
Tel.: +40 21 637 00 47  
info@pharmapromotion.ro